

胃バリウム検査を受けられる方へ

胃バリウム検査は、バリウム液を飲み、エックス線で食道、胃、十二指腸などの形態や粘膜の状態を観察して、がんや潰瘍などがないか調べる検査です。

以下の内容を読み、ご理解いただいた上で検査をお受けください。

下記の方は検査を受けられません



- ▼バリウム液に対する過敏症(アレルギー)の方
- ▼妊娠している方・またはその可能性がある方
- ▼検査当日の朝、食事を摂った方
- ▼検査当日の朝、喫煙された方
- ▼体重が100kg以上の方



下記の方は検査をお断りすることがあります

- ▼胃腸疾患の既往歴がある方
- ▼バリウム検査で気分が悪くなったことがある方
- ▼検査台の上で体位変換が難しい方

検査をおこなうにあたり、同意書の提出をお願いしています。**検査当日忘れずに同意書を持参してください。**

バリウムによる偶発症および副作用

【誤嚥による偶発症】

誤嚥することにより、呼吸困難、肺炎、肺肉芽腫の形成等を引き起こす恐れがあるので、ご高齢の方や、むせやすい方、喘息をお持ちの方は注意が必要です。

【重大な副作用】

アナフィラキシーショック

過敏症反応を起こしやすい体質の方は、アレルギー症状を起こす危険性があります。
(症状:顔面蒼白、手足が冷たくなる、血圧低下、のどが詰まる、息苦しい等。)

バリウム停滞による副作用

バリウムがスムーズに排泄されずに、消化管穿孔、腸閉塞、大腸炎、憩室炎、バリウム虫垂炎等を引き起こすことが報告されています。

【その他の副作用】

排便困難、便秘、一過性の下痢・腹痛、悪心・嘔吐、発疹、じん麻疹等。

以上、このような合併症が生じた際には、必要に応じ、診察、処置、検査、治療等を適切かつ迅速に行います。

以上、ご理解を頂き、胃バリウム検査を受けることに同意されましたら、同意書にご署名の上、検査当日受付時に提出をお願い致します。

六ヶ所村地域家庭医療センター 健診室

0175-73-7120 (直)

0175-73-7122 (代)

※検査をキャンセルする場合は必ず連絡をお願いします

胃バリウム検査のご案内

検査前日および当日は以下のことにご協力ください。

前日	飲食	<ul style="list-style-type: none"> ・検査前日の夜9時以降から検査終了まで食事はしないでください。 ・水は飲んでも差し支えありませんが、アルコールは避けてください。
当日	飲食	<ul style="list-style-type: none"> ・朝7時頃までは水200ml以内なら飲んでも差し支えありません。 ・お茶、コーヒー、アメ、ガム、たばこなどの嗜好品も控えてください。
	内薬	<ul style="list-style-type: none"> ・高血圧、心臓病の方は薬を朝7時まで約100ccの水で服用してください。 ・糖尿病の方は、インスリン注射や血糖降下剤は服用しないでください。 (！低血糖の危険性があります！)
	その他	<ul style="list-style-type: none"> ・入れ歯安定剤は検査当日～検査後まで使用しないでください。 (！画像上影響を与える恐れがあります！)



◆検査は10:00頃から行います。

当日の状況により、時間通りに検査開始、終了できるとは限らないことをあらかじめご了承ください。

検査中	<ul style="list-style-type: none"> ・バリウム液を飲むと、胃が重い、胃が張るなどの症状がありますが、一時的なもので心配ありません。また、ごくまれに過敏反応(血圧低下、呼吸困難等)が起こることがあります。気分が悪いなどありましたら、我慢せずにお申し出ください。 ・検査は、医師、放射線技師の声のみで行っていきますので、指示通りに体を動かすようお願いいたします。
-----	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

検査後	<p>※重篤な副作用を防止するために、迅速なバリウム排泄が大切です。</p>
	<ul style="list-style-type: none"> ・検査後に下剤(水液)を飲んでいただきますが、前回バリウムがスムーズに排泄されなかった方や、便秘気味の方は追加で下剤をお出しできますので、スタッフか診察時にお申し出ください。
	<ul style="list-style-type: none"> ・検査後は、消化の良い食事をできるだけ摂り、2～3日は多めの水分摂取を心がけてください。また、アルコール類を摂取すると、バリウムが固まってしまうので控えてください。
	<ul style="list-style-type: none"> ・数日間バリウム便が出ない場合や、持続する便秘、腹痛等、症状が現れた際には重症化する前に、受診もしくはご連絡ください。
	<ul style="list-style-type: none"> ・バリウム使用後の重篤な副作用として、アレルギー症状が出るがありますが、次のような症状が現れた際には下記連絡先へ連絡してください。 <p><u>症状:じんましん、顔面蒼白、手足が冷たくなる、のどが詰まる、息苦しい、嘔吐など</u></p>

